

Musvåge



Foto 01. D. 8. august 2000. Broager Vestermark



Foto 02. D. 14. oktober 2000. Broager Vestermark



Foto 03. D. 24. oktober 2021. Broager Vestermark



Foto 04. D. 19. april 2022. Broager Vestermark



Foto 05. D. 16. juni 2022. Broager Vestermark



Foto 06. D. 26. januar 2021. Broager Vig

Forvekslingsmuligheder

Musvågen er nok den rovfugl, der kan variere mest i udseende. Fjerdragten kan variere fra næsten helt hvid (foto 04) over "normal" (foto 01) til meget mørk (foto 03).

Musvågens variation betyder, at der gennem tiderne har været mange forvekslinger med andre arter. F.eks. er mange Fjeldvåger med garanti fejlbestemt i tidens løb. En våge med lys/hvid overgump kan sagtens være en Mus- og ikke Fjeldvåge.



Foto 07. Fjeldvåge. D. 27. april 2008. Tontoft Nakke.

Fjeldvåge er kendetegnet ved lyst hoved, brun bryst og bug, hvide vingeundersider med mørke knoer, samt helt hvid under- og overgump foran mørk hale.

En anden art, hvor en fejlbestemmelse er mulig, er Hvepsevåge. Ikke mindst fordi, at Hvepsevågen også kan variere voldsomt i dragtens grundfarve.



Foto 08. Hvepsevåge - han. D. 21. juni 2017. Uggerby Klitplantage.

En typisk Hvepsevåge er tydeligt stribet på hele undersiden. Og så har den to tydelige mørkestriber på tværs af halen samt mørkt endebånd. Ofte vil man kunne se, at hånden er gennemskinskelig og derfor fremstår lysere end resten af vingen. Når Hvepsevågen flyver, har den vingerne let hængende, hvor Musvågens vinger er lidt løftede. Iøvrigt kan Hvepsevågen, ligesom Musvågen, være meget variabel i fjerdragstens farve :



Foto 09. Hvepsevåge. D. 19. september 2018.
Vendepladsen ved Sønderkoven i Sønderborg.