


Flensborg Fjord og Nybøl Nor



Ederfugle ved Kragesand (foto Martin Jessen)



Beskrivelse

IBA-området Flensborg Fjord og Nybøl Nor dækker området fra Kobbermølle Bugt i bunden af Flensborg Fjord til

Pøls Rev øst for Kegsnæs. Dertil kommer så Nybøl Nor og en række mindre søer i tilknytning til området. Den yderste halvdel af Flensborg Fjord (Flensborg Yderfjord) og Nybøl Nor er EF-Fuglebeskyttelsesområde.

Adgangsforhold

Der er gode adgangsforhold til det meste af området. Flere steder er der gode obs-poster direkte fra offentlig vej. Det er der bla. ved Sønderhav, Egersund, Brunsnæs/Catrinesminde, Sønderborg og Sønderby på Kegsnæs. Desuden går Gendarmstien langs med kysten, hele vejen fra Padborg til Høruphav, så der er rige muligheder for at gå i området.

Pga. områdets størrelse er det ofte en fordel at have en scope med. Især i de yderste områder i Sønderborg Bugt og omkring Kegsnæs.



Om lokaliteten

[Beskrivelse](#)

[Nyheder](#)

[Beskyttelse](#)

[Status](#)

[Caretakergruppen](#)

[Optællingsvejledninger](#)

[Caretakere](#)

Observationer

[Dellokaliteter](#)

[Observationer](#)

[Optællingsresultater og fokusarter](#)

Vigtige arter

[Troidand](#)

[Bjergand](#)

[Ederfugl](#)

[Hvinand](#)

[Toppet Skallesluger](#)



Fakta

Kommuner: [Aabenraa](#), [Sønderborg](#)

Areal: 18660 hektar

Ejerforhold: Næsten 100%
statsejet

De tre alvorligste trusler:

- Fiskeri
- Jagt
- Windsurfing

De tre mest påkrævede forbedringer:

- Færdselsbegrænsning
- Jagtbegrænsning
- Regulering af muslingefiskeri

Sidevisninger

Denne måned: 237

Sidste måned: 467

Beskyttelse

Delvis EF-fugle-beskyttelsesområde (3350 ha)

Status

Området er primært et rasteområde for store mængder af vandfugle.

Sammensætningen af arterne ændrer sig en del i de forskellige dele af området. I de yderste områder, ved Kegnæs, Sønderborg Bugt og syd for Broagerland ses der især mange Ederfugle, og der er ofte en hel del Havlitter og Sortænder. Desuden er der gode chancer for bla. lommer og Fløjlsænder.

Længere inde i fjorden og i Nybøl Nor er det især Troldænder, Blishøns, Lappedykkere, Skalleslugere og Hvinænder der dominerer. Dertil kommer ret gode chancer for bla. Havørn og Isfugl.

Søerne er også domineret af pæne antal af Troldænder (op til 6000 i Gråstensøerne), men i for- og efterår raster der også en hel del svømmeænder. Bla. ses der en del Knarænder.

I umiddelbar nærhed af IBA-området raster der en en hel del Grågæs og Sangsvaner, og disse kommer også af og til inden for selve området. Ofte gemmer der sig andre arter af gæs i de store Grågåseflokke.